HELLENIC DERMOSCOPY SOCIETY

HDS

5η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΛ.Ε.ΔΕ.

Η Δερματοσκόπηση σε όλες τις ηλικίες μέσα από καθημερινά κλινικά σενάρια

8-10 Δεκεμβρίου 2017

Ξενοδοχείο Divani Caravel
Αθήνα

www.hds-dermoscopy.gr

Τελικό Πρόγραμμα

Roche

Erivedge®
vismodegib

Treatment Transformed

PRIX GALIEN GREECE 2015
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Rochemed.gr

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail (hellas.drugsafety@roche.com), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

ROCHE (Hellas) A.E.
Αλαμάνας 4 & Δελφών 151 25 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 6166100, fax: 210 6166159
email: hellas.medinfo@roche.com

800 111 93 00 Ελλάδα (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
800 92 668 Κύπρος (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Η εταιρεία Roche Hellas AE είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αίτησης.

Erivedge σκληρά καψάκια 150 mg

ERIVEDGE-BCC_8_1117

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος	**Γιώργος Χαϊδεμένος**
Γεν. Γραμματέας	**Ελισσάβετ (Μπέττυ) Λαζαρίδου**
Ταμίας	**Ζωή Απάλλα**
Μέλη	**Δημήτριος Σγούρος,** *με αρμοδιότητες Ειδ. Γραμματέα*
	Αιμίλιος Λάλλας
	Αλέξανδρος Στρατηγός
	Αλέξανδρος Κατούλης

HELLENIC DERMOSCOPY SOCIETY
HDS

Ελληνική Εταιρεία Δερματοσκόπησης

Σόλωνος 46, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: (+30) 6981 564884

Email: info@hds-dermoscopy.gr

www.hds-dermoscopy.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Καλωσόρισμα Προέδρου 5

Ομιλητές - Πρόεδροι ..... 6 - 7

Συνοπτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα 9

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 12

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου ..... 13 - 15

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 16

Γενικές Πληροφορίες 18

Ευρετήριο Ομιλητών & Προέδρων 19

Ευχαριστίες 22

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ERA ΕΠΕ
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ: 210 3634 944, 3632 950, **Fax:** 210 3631 690
E-mail: info@era.gr, **Web Site:** www.era.gr

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι και μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης,

Λίγες μέρες μετά το πανθομολογούμενα επιτυχημένο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΑΕ έρχεται η ώρα του 5ου Συνεδρίου της ΕΛ.Ε.ΔΕ. που θα γίνει στο Divani Caravel στην Αθήνα, από τις 8 έως στις 10 Δεκεμβρίου 2017. Το Πρόγραμμα είναι ελκυστικό όπως προδιαθέτει και ο τίτλος του ***«Η δερματοσκόπηση σε όλες τις ηλικίες, μέσα από καθημερινά κλινικά σενάρια»*** και η προφανής σύζευξη της επιστημονικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή.

Το συνέδριο καλούνται να παρακολουθήσουν όχι μόνον οι ασχολούμενοι με τη Δερματοσκόπηση (αποκαλούμενοι και «Δερματοσκόποι»), αλλά και όλοι οι Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι διότι η Δερματοσκόπηση και η Διαγνωστική Δερματολογία είναι αυτονόητα άρρηκτα δεμένες. Γι αυτό και Τακτικά μέλη στην Εταιρεία μας είναι μόνον οι Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι που είναι ενεργά μέλη της Ελληνικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, γεγονός που δεν γνωρίζουμε να έχει δεύτερο ανάλογο στα Ιατρικά Χρονικά.

Η στενή μας σχέση με την International Dermoscopy Society, μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε στο Πρόγραμμα, την Παρασκευή το απόγευμα, το 2ο Course της IDS στο οποίο θα συμμετέχουν οι *G.Argenziano,* ο *H.Kittler* και ο *Αιμίλιος Λάλλας.* Η εμπειρία από το περυσινό course στη Θεσσαλονίκη, προδιαθέτει για μεγάλη προσέλευση των συναδέλφων Δερματολόγων. Γι αυτό παρακαλώ για την έγκαιρη εγγραφή σας, ώστε να μη δημιουργηθούν οι ουρές που σας καθυστερούν από τις ομιλίες, οι οποίες προβλέπονται συναρπαστικές.

Τέλος, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017, μετά το πέρας του Επιστημονικού μας Προγράμματος, θα υπάρξει Συνέλευση την οποία προγραμμάτισαν η ΕΔΑΕ και η ΕΕΔΑ για θέματα που μας αφορούν.

Σας περιμένω όλους λοιπόν στην 5η Επιστημονική Εκδήλωση της ΕΛ.Ε.ΔΕ. στην Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου 2017.

Φιλικά,

Γιώργος Χαϊδεμένος

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Argenziano Guiseppe
Dermatology Unit, University of Campania Nuovo Policlinico (edificio 9C), Naples, Italy

Kittler Harald
Department of Dermatology Medical University of Vienna, Austria

Ανθόπουλος Τηλέμαχος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Απάλλα Ζωή
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α', Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Ευαγγέλου Γεώργιος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμ. Α' Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

Ζάρρας Αλέξιος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Ζωγραφάκης Χαράλαμπος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεοχάρης Σωτήρης
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Ιωαννίδης Δημήτριος
Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Καλογερόπουλος Νικόλαος
Ειδικός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, MD

Καραμποΐκη Βασιλική
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Κατούλης Αλέξανδρος
Αν. Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη Έλμα
τ. Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Κουτσούκου Ξανθίππη-Αργυρώ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, MD, MSc

Κρασαγάκης Κωνσταντίνος
Αν. Καθηγητής Δερματολογίας, Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης

Λαζαρίδου Ελισάβετ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Δερματολογική Κλινική, Α.Π.Θ.

Λάλλας Αιμίλιος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α.Π.Θ., Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Λέκκας Διονύσης
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Λεφάκη-Μαντέκου Ιωάννα
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, τ. Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Νεαμονιτός Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρείας

Παπακώστας Δημήτριος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βερολίνου "Charite"

Παπανίκου Σοφία
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

Πλάκα Μιχαέλα
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α' Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»

Πολυδώρου Δωροθέα
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Πολυζώης Ζώης
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επίτιμος Πρόεδρος & Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής

Ποτουρίδου Ειρήνη
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Ράλλης Ευστάθιος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Γενικός Αρχίατρος, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Σγούρος Δημήτριος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Β' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών νόσων Θεσσαλονίκης

Στρατηγός Αλέξανδρος
Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

Σωτηρίου Έλενα
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Α΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ.

Φωτιάδου Χριστίνα
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Χαϊδεμένος Γεώργιος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δρ Δερματολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τ. Διευθυντής Δερματολογικής Κρατικής Κλινικής Νοσοκομείου Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης

Χασάπη Βασιλική
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»

Χριστοφορίδης Πρόδρομος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

FREZYDERM
ac-norm

Η ΑΛΛΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΜΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

medilike πρόταση

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

- βιομίμηση τοπικών ρετινοειδών
- βιομίμηση τοπικών αντιβιοτικών

optimized delivery technology

ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

- σταδιακή απελευθέρωση συστατικών
- άμεσα διαθέσιμη δράση

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
ΧΩΡΙΣ PARABENS | ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΑ

Κεντρικά: Μενάνδρου 75, 104 37, Αθήνα, Τ: 210 5246900, Φ: 210 5244433, **Εργοστάσιο:** Λ. Τατοΐου 4, 144 51 Μεταμόρφωση,
Τ: 210 2846586, Φ: 210 2848508, info@frezyderm.gr, **www.frezyderm.gr**

FREZYDERM
DERMOCEUTICALS - PHARMACEUTICALS
NUTRITION PRODUCTS

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 Δεκεμβρίου 2017

15:15-16:15	Εγγραφές
16:15-16:30	Welcome - Introduction
16:30-20:00	**International Dermoscopy Society Course** "Traps and Tips on Dermoscopy"
18.30-19.00	Coffee Break
19:00-20:00	**International Dermoscopy Society Course** *(συνέχεια)*
20:00	Δεξίωση Υποδοχής

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 Δεκεμβρίου 2017

09:00-10:30	Συνήθεις δερματοσκοπικές εικόνες και προβληματισμοί σε παιδιά και εφήβους
10:30-11:00	Διάλειμμα - Καφές
11:00-12:30	Οι διαφορετικές οπτικές του Δυσπλαστικού Σπίλου. Η πιο αμφιλεγόμενη νοσολογική οντότητα της Δερματολογίας
12:30-13:00	**Δορυφορική Διάλεξη** *Οργάνωση* GALDERMA
13:00-14:00	Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα
14:00-14:30	**Διάλεξη:** «Η Δερματοσκόπηση στη Γενική Δερματολογία. Προσέγγιση μέσω ανάλυσης περιστατικών»
14:30-16:00	Χρόνια ηλιοεκτεθειμένο δέρμα. Η συμβολή της Δερματοσκόπησης στη διάγνωση του δερματικού καρκίνου στην τρίτη ηλικία
16:00-16:30	Διάλειμμα - Καφές
16:30-18:00	Πρακτική Δερματοσκόπηση
18:00-19:00	Δερματοσκόπηση πέρα από τη διάγνωση

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Δεκεμβρίου 2017

09:00-10:15	Η Δερματοσκόπηση ως πολύτιμος βοηθός στο δερματολογικό ιατρείο
10:15-10:30	Διάλειμμα - Καφές
10:30-12:30	Διαχείριση ιδιαίτερων περιστατικών. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής
12:30	Λήξη συνεδρίου
12:30-17:00	Γενική Συνέλευση Ε.Δ.Α.Ε. - Ε.Ε.Ε.Δ.Α. με την συμμετοχή της ΕΛ.Ε.ΔΕ.

5TH WORLD CONGRESS OF DERMOSCOPY THESSALONIKI • GREECE

JUNE 14-16, 2018

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE:
January 20th, 2018

THESSALONIKI CONCERT HALL
CONVENTION & CULTURAL CENTER

www.dermoscopy-congress2018.com

Congress Secretariat **ERA Ltd** 17 Asklipiou Str., 106 80 Athens, Greece **T:** +30 210 3634944, **F:** +30 210 3631690, **E:** info@era.gr, **W:** www.era.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15:15-16:15	**Εγγραφές**
16:15-16:30	**Welcome - Introduction** **Georgios Chaidemenos, Elizabeth Lazaridou**
16:30-20:00	**International Dermoscopy Society Course** **Traps and Tips on Dermoscopy** False positives… **Aimilios Lallas** False negatives… **Geppi Argenziano,** *Italy* Without pigment… **Harald Kittler,** *Austria* Questions and Answers **All together**
18:30-19:00	**Coffee Break**
19:00-20:00	Challenging cases **All together**
20:00	**Δεξίωση Υποδοχής**

09:00-10:30 **Συνήθεις δερματοσκοπικές εικόνες και προβληματισμοί σε παιδιά και εφήβους**

Προεδρείο: **Βασιλική Χασάπη, Καλογερόπουλος Νικόλαος, Δωροθέα Πολυδώρου**

Συγγενείς Σπίλοι
Δημήτριος Παπακώστας

Καλοήθεις, μη μελανοκυτταρικές βλάβες
Χριστίνα Φωτιάδου

Σπιτζοειδείς βλάβες. Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση
Αιμίλιος Λάλλας

Συζήτηση

10:30-11:00 **Διάλειμμα – Καφές**

11:00-12:30 **Οι διαφορετικές οπτικές του Δυσπλαστικού Σπίλου. Η πιο αμφιλεγόμενη νοσολογική οντότητα της Δερματολογίας**

Προεδρείο: **Αλέξανδρος Στρατηγός, Κωνσταντίνος Κρασαγάκης, Ζωή Απάλλα**

Δερματοσκοπικά πρότυπα κοινών και άτυπων σπίλων
Ελισάβετ Λαζαρίδου

Η κλινική μορφολογία και η βιολογική σημασία του δυσπλαστικού σπίλου
Αλέξανδρος Στρατηγός

Dysplastic nevus. Facts and controversies
Harald Kittler, *Austria*

Συζήτηση

12:30-13:00	**ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ** *Οργάνωση* GALDERMA *Προεδρείο:* **Αλέξανδρος Στρατηγός** «Φωτοδυναμική Θεραπεία με το Φως της Ημέρας: Εφαρμογή και οφέλη για τους ασθενείς με Ακτινικές Κερατώσεις» **Ζωή Απάλλα**
13:00-14:00	**Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα**
14:00-14:30	**ΔΙΑΛΕΞΗ** *Προεδρείο:* **Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη Έλμα** Η Δερματοσκόπηση στη Γενική Δερματολογία. Προσέγγιση μέσω ανάλυσης περιστατικών **Γεώργιος Χαϊδεμένος**
14:30-16:00	**Χρόνια ηλιοεκτεθειμένο δέρμα. Η συμβολή της Δερματοσκόπησης στη διάγνωση του δερματικού καρκίνου στην τρίτη ηλικία** *Προεδρείο:* **Αιμίλιος Λάλλας, Έλενα Σωτηρίου, Ειρήνη Ποτουρίδου** Κακοήθης φακή Vs. Μελαγχρωματική Ακτινική Υπερκεράτωση και Σμηγματορροϊκή Υπερκεράτωση **Σοφία Παπανίκου** Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα Vs. Ακανθοκυτταρικός Καρκίνος **Γεώργιος Ευαγγέλου** Problematic lesions in the elderly. Cases to discuss **Giuseppe Argenziano,** *Italy* *Συζήτηση*
16:00-16:30	**Διάλειμμα - Καφές**

16:30-18:00

Πρακτική Δερματοσκόπηση

Προεδρείο: **Δημήτριος Ιωαννίδης, Αλέξανδρος Κατούλης, Γεώργιος Κοντοχριστόπουλος**

Συχνές και ασυνήθιστες παθήσεις τριχωτού κεφαλής σε παιδιά. Όταν η Τριχοσκόπηση δίνει τη λύση
Βασιλική Χασάπη

Παθήσεις ονύχων. Η Δερματοσκόπηση μπορεί να δώσει τη λύση σε διαγνωστικούς προβληματισμούς;
Θεόδωρος Σιδηρόπουλος

«Χαρτογράφηση Σπίλων». Σε ποιους, κάθε πότε και πώς;
Δημήτριος Σγούρος

Συζήτηση

18:00-19:00

Δερματοσκόπηση πέρα από τη διάγνωση

Προεδρείο: **Ελισάβετ Λαζαρίδου, Ιωάννα Λεφάκη-Μαντέκου**

Η συμβολή της Δερματοσκόπησης στην επιλογή και αξιολόγηση της θεραπείας
Αλέξανδρος Κατούλης

Ιστοπαθολογικές και δερματοσκοπικές συσχετίσεις μελανώματος. Περιστατικά της «γκρίζας ζώνης»
Ζωή Απάλλα

Συζήτηση

09:00-10:15	**Η Δερματοσκόπηση ως πολύτιμος βοηθός στο δερματολογικό ιατρείο** *Προεδρείο:* **Πρόδρομος Χριστοφορίδης, Δημήτριος Σγούρος, Ευστάθιος Ράλλης** **Παρουσίαση Περιστατικών:** **Πλάκα Μιχαέλα** **Ξανθίππη-Αργυρώ Κουτσούκου** **Λέκκας Διονύσης** **Καραμποΐκη Βασιλική** **Ζάρρας Αλέξιος**
10:15-10:30	**Διάλειμμα – Καφές**
10:30-12:30	**Διαχείριση ιδιαίτερων περιστατικών. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής** *Προεδρείο:* **Γεώργιος Χαϊδεμένος, Κωνσταντίνος Νεαμονιτός, Ζώης Πολυζώης** **Επιμέλεια-Σχολιασμός: Κωνσταντίνος Νεαμονιτός, Ζώης Πολυζώης, Τηλέμαχος Ανθόπουλος, Χαράλαμπος Ζωγραφάκης, Σωτήρης Θεοχάρης, Αιμίλιος Λάλλας, Δημήτριος Σγούρος, Αλέξανδρος Κατούλης, Ζωή Απάλλα, Ελισάβετ Λαζαρίδου**
	Λήξη συνεδρίου
12:30-17:00	**Γενική Συνέλευση Ε.Δ.Α.Ε. - Ε.Ε.Ε.Δ.Α. με την συμμετοχή της ΕΛ.Ε.ΔΕ.**

Stelara®
(ustekinumab)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 45 mg ustekinumab σε 0,5 mL. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 90 mg ustekinumab σε 1 mL. Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-12/23 που παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μυελώματος ποντικιών με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Ενέσιμο διάλυμα. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Ενέσιμο διάλυμα. Το διάλυμα είναι διαυγές ως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: EU/1/08/494/003. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: EU/1/08/494/004. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 11 Νοεμβρίου 2016. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
INJ. SOL.45mg (90mg/ml)/ 0,5ml PF. SYR.	BT x 1 PF. SYR x 0,5ML	2.272,05€	2.866,12€
INJ. SOL. 90MG/1ML PF.SYR.	BT x 1 PF. SYR. x 1,0ML	2.388,88€	2.996,98€

PHGR/SPSO/0717/0001

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Janssen Immunology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ

Η 5η Επιστημονική Εκδήλωση της ΕΛ.Ε.ΔΕ. πραγματοποιείται στις **8-10 Δεκεμβρίου 2017,** στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, στην **Αθήνα**. Στον ευρύτερο χώρο του Ξενοδοχείου θα λειτουργήσουν:

- Έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών οργάνων & μηχανημάτων.
- Η Γραμματεία του Συνεδρίου

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η 5η Επιστημονική Εκδήλωση της ΕΛ.Ε.ΔΕ. έχει λάβει «14» Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το μοριοδοτημένο πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παραδίδεται από την Γραμματεία του συνεδρίου, με την προϋπόθεση παρακολούθησης του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με την τρέχουσα εγκύκλιο του ΕΟΦ. Οι σύνεδροι θα πρέπει να συμπληρώνουν το Δελτίο Αξιολόγησης του συνεδρίου, πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	Έως 8 Νοεμβρίου	Μετά τις 8 Νοεμβρίου
Ειδικευμένοι - Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ.	50€	70€
Ειδικευμένοι - Μη Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ.	150€	170€
Ειδικευόμενοι - Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ.	20€	40€
Ειδικευόμενοι - Μη Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ.	120€	140€
Ιατρικό προσωπικό - Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ.	30€	50€
Ιατρικό προσωπικό - Μη Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ.	120€	140€
Φοιτητές*	ΔΩΡΕΑΝ	10€

Η Εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση Επιστημονικών Συνεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, Διαλείμματα καφέ, Διαλείμματα γεύματος, Δεξίωση Υποδοχής, Πιστοποιητικό Συμμετοχής.

***Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής των φοιτητών είναι η υποβολή αντιγράφου της φοιτητικής τους ταυτότητας, μαζί με την αποστολή του δελτίου συμμετοχής.**
***Σημείωση:* Κατά την τιμολόγηση οι τιμές των εγγραφών επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ**

ΔΙΑΜΟΝΗ *(συμπ/νων φόρων & πρωϊνού)*

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ	ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
DIVANI CARAVEL (συνεδριακό ξενοδοχείο)	€ 150

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ERA ΕΠΕ Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ: 210 3634 944, 3632 950, Fax: 210 3631 690
E-mail: info@era.gr, Web Site: www.era.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ

	Σελίδα
Argenziano Giuseppe	12, 14
Kittler Harald	12, 13
Ανθόπουλος Τηλέμαχος	16
Απάλλα Ζωή	13, 14, 15, 16
Ευαγγέλου Γεώργιος	14
Ζάρρας Αλέξιος	16
Ζωγραφάκης Χαράλαμπος	16
Θεοχάρης Σωτήρης	16
Ιωαννίδης Δημήτριος	14, 15
Καλογερόπουλος Νικόλαος	13
Καραμποΐκη Βασιλική	16
Κατούλης Αλέξανδρος	15, 16
Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος	15
Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη Έλμα	14
Κουτσούκου Ξανθίππη-Αργυρώ	16
Κρασαγάκης Κωνσταντίνος	13
Λαζαρίδου Ελισάβετ	12, 13, 15, 16
Λάλλας Αιμίλιος	12, 13, 14, 16
Λέκκας Διονύσης	16
Λεφάκη-Μαντέκου Ιωάννα	15
Νεαμονιτός Κωνσταντίνος	16
Παπακώστας Δημήτριος	13
Παπανίκου Σοφία	14
Πλάκα Μιχαέλα	16
Πολυδώρου Δωροθέα	13
Πολυζώης Ζώης	16
Ποτουρίδου Ειρήνη	14
Ράλλης Ευστάθιος	16
Σγούρος Δημήτριος	15, 16
Σιδηρόπουλος Θεόδωρος	15
Στρατηγός Αλέξανδρος	13, 14
Σωτηρίου Έλενα	14
Φωτιάδου χριστίνα	13
Χαϊδεμένος Γεώργιος	12, 14, 16
Χασάπη Βασιλική	13, 15
Χριστοφορίδης Πρόδρομος	16

Σημειώσεις

Cosentyx®
secukinumab

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cosentyx 150 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 150 mg secukinumab* σε 1 ml.*Το secukinumab είναι ένα ανασυνδυασμένο πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα ελεκτικό για την ιντερλευκίνη-17Α. Το secukinumab ανήκει στην IgG1/κ-κατηγορία και παράγεται σε κύτταρα Ωοθηκών Κινεζικού Κρικητού (CHO). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ** Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας (πένα SensoReady) Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις** Ψωρίαση κατά πλάκας Το Cosentyx ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. Ψωριασική αρθρίτιδα Το Cosentyx, σε μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ), ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς όταν η αντιπαθητική σε προηγούμενη θεραπεία με τροποποιητικό της νόσου αντιρευματικό φάρμακο (DMARD) δεν ήταν επαρκής (βλ. παράγραφο 5.1). Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα Το Cosentyx ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας σε ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στη συμβατική θεραπεία. **4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης** Το Cosentyx προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία στη διάγνωση και τη θεραπεία των νοσημάτων για τα οποία ενδείκνυται το Cosentyx. Δοσολογία Ψωρίαση κατά πλάκας Η συνιστώμενη δόση είναι 300 mg secukinumab με υποδόρια έγκυση με αρχική χορήγηση της δόσης τις Εβδομάδες 0, 1, 2, 3 και 4, ακολουθούμενη από μηνιαία δόση συντήρησης. Η κάθε δόση των 300 mg χορηγείται ως δύο υποδόριες ενέσεις των 150 mg. Ψωριασική αρθρίτιδα Για τους ασθενείς με συνυπάρχουσα μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας ή που έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση σε anti-TNFα (IR), η συνιστώμενη δόση είναι 300 mg με υποδόρια έγκυση και αρχική χορήγηση τις Εβδομάδες 0, 1, 2, 3 και 4, ακολουθούμενη από μηνιαία δοσολογία συντήρησης. Κάθε δόση των 300 mg χορηγείται ως δύο υποδόριες ενέσεις των 150 mg. Για τους άλλους ασθενείς, η συνιστώμενη δόση είναι 150 mg με υποδόρια έγκυση και αρχική χορήγηση της Εβδομάδες 0,1, 2, 3 και 4, ακολουθούμενη από δοσολογία συντήρησης με μηνιαία χορήγηση. Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα Η συνιστώμενη δόση είναι 150 mg με υποδόρια έγκυση και αρχική χορήγηση της Εβδομάδες 0, 1, 2, 3 και 4, ακολουθούμενη από δοσολογία συντήρησης με μηνιαία χορήγηση. Για όλες τις παραπάνω ενδείξεις, τα διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η κλινική ανταπόκριση επιτυγχάνεται συνήθως εντός 16 εβδομάδων θεραπείας. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν εμφανίσει ανταπόκριση μετά από θεραπεία έως και 16 εβδομάδων. Ορισμένοι ασθενείς με αρχική μερική ανταπόκριση πιθανόν να εμφανίσουν στη συνέχεια βελτίωση με συνέχιση της θεραπείας πέραν των 16 εβδομάδων. Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης (βλ. παράγραφο 5.2). Νεφρική δυσλειτουργία / ηπατική δυσλειτουργία Το Cosentyx δεν έχει μελετηθεί σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δεν μπορούν να γίνουν συστάσεις για τη δοσολογία. Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Cosentyx σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης Το Cosentyx πρέπει να χορηγείται με υποδόρια έγκση. Εάν είναι εφικτό, οι περιοχές του δέρματος που εμφανίζουν ψωρίαση θα πρέπει να αποφεύγονται ως σημεία της έγκσης. Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην τεχνική της υποδόριας έγκσης, οι ασθενείς ενθέρετα να κάνουν μόνοι τους την έγκση του Cosentyx, εάν ο ιατρός κρίνει ότι αυτό είναι κατάλληλο. Ωστόσο, ο ιατρός θα πρέπει να διασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση των ασθενών. Οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν οδηγίες ώστε να ενίσχυν την πλήρη ποσότητα του Cosentyx σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση παρέχονται στο φύλλο οδηγών χρήσης. **4.3 Αντενδείξεις** Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Κλινικά σημαντική, ενεργός λοίμωξη (π.χ. ενεργός φυματίωση, βλ. παράγραφο 4.4). **4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση** Λοιμώξεις Το Cosentyx δυνητικά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο των λοιμώξεων. Στις κλινικές μελέτες, έλκουν παρατηρηθεί λοιμώξεις σε ασθενείς που λάμβαναν Cosentyx (βλ. παράγραφο 4.8) Οι περισσότερες από αυτές ήταν ήπιες ή μέτριας βαρύτητας λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού, όπως ρινοφαρυγγίτιδα, και δεν έχρηζαν διακοπής της θεραπείας. Σχετιζόμενες με τον μηχανισμό δράσης του Cosentyx, μη-φυβαρές βλεννογονοδερματικές καντινταιακές λοιμώξεις αναφέρθηκαν πιο συχνά με το secukinumab απ' ότι με το κονικό φάρμακο στις κλινικές μελέτες της ψωρίασης (3,55 ανά 100 έτη ασθενών για το secukinumab 300 mg έναντι 1,00 ανά 100 έτη ασθενών για το εικονικό φάρμακο) (βλ. παράγραφο 4.8). Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης του Cosentyx σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη ή ιστορικό υποτροπιαζόμενας λοίμωξης. Στους ασθενείς θα πρέπει να δίνονται οδηγίες να ζητούν ιατρική συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης σημείων ή συμπτωμάτων που υποδηλώνουν λοίμωξη. Εάν ο ασθενής αναπτύξει σοβαρή λοίμωξη, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και το Cosentyx δεν θα πρέπει να χορηγείται μέχρι την αποβραφή της λοίμωξης. Δεν αναφέρθηκε αυξημένη ευαισθησία στη φυματίωση στις κλινικές μελέτες. Ωστόσο, το Cosentyx δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργό φυματίωση. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης αντι-φυματικής θεραπείας πριν από την έναρξη του Cosentyx στους ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση. Νόσος του Crohn Απαιτείται προσοχή όταν το Cosentyx συνταγογραφείται σε ασθενείς με νόσο του Crohn καθώς παρατηρήθηκαν έξαρσεις της νόσου του Crohn, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν σοβαρές, σε κλινικές μελέτες τόσο στην ομάδα του Cosentyx όσο και στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με Cosentyx και έχουν νόσο του Crohn θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Στις κλινικές μελέτες, έχουν παρατηρηθεί σπάνιες περιπτώσεις αναφυλακτικών αντιδράσεων σε ασθενείς υπό θεραπεία με Cosentyx. Σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης ή άλλων σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων, η χορήγηση του Cosentyx πρέπει να διακοπεί αμέσως και να ξεκινήσει κατάλληλη αγωγή. Ατομα ευαίσθητα στο Λάτεξ Το αφαιρούμενο κάπάκι της προγεμισμένης πένας του Cosentyx περιέχει ένα παράγωγο του φυσικού ελαστικού λάτεξ. Δεν έχει ανγενωθεί μέχρι σήμερα φυσικό ελαστικό λάτεξ στο αφαιρούμενο καπάκι. Ωστόσο, η χρήση των προγεμισμένων συσκευών τύπου πένας του Cosentyx σε άτομα ευαίσθητα στο λάτεξ δεν έχει μελετηθεί και επομένως υπάρχει δυνητικός κίνδυνος αντιδράσεων υπερευαισθησίας ο οποίος δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Εμβολιασμοί Εμβόλια με ζώντες μικροοργανισμούς δεν θα πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με το Cosentyx. Οι ασθενείς που λαμβάνουν Cosentyx μπορούν ταυτόχρονα να εμβολιασθούν με εμβόλια αδρανοποιημένων ή μη ζώντων μικροοργανισμών. Σε μία μελέτη, μετά από εμβολιασμούς με μηνιγγιτιδόκοκκο (*meningococcus*) και με αδρανοποιημένο ιό γρίπης (*influenza*), παρόμοια ποσοστά υγιών εθελοντών είτε από θεραπεία με 150 mg secukinumab είτε από θεραπεία με εικονικό φάρμακο ανέπτυξαν επαρκή ανοσολογική απάντηση με τουλάχιστον τετραπλασιασμό των τίτλων αντισωμάτων κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου και της γρίπης. Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι το Cosentyx δεν καταστέλλει τη χυμική ανοσολογική απάντηση στα εμβόλια του μηνιγγιτιδόκοκκου και της γρίπης. Ταυτόχρονη ανοσοκαταστολική θεραπεία Στις μελέτες της ψωρίασης, δεν έχουν αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Cosentyx σε συνδυασμό με ανοσοκαταστολτικά, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, ή με φωτοθεραπεία (βλ. επίσης παράγραφο 4.5). **4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης** Δεν θα πρέπει να χορηγούνται εμβόλια με ζώντες μικροοργανισμούς ταυτόχρονα με το Cosentyx (βλ. επίσης παράγραφο 4.4). Σε μια μελέτη σε άτομα με ψωρίαση κατά πλάκας, δεν παρατηρήθηκε καμία αλληλεπίδραση μεταξύ του secukinumab και της μιδαζολάμης (υπόστρωμα του CYP3A4). Δεν παρατηρήθηκε καμία αλληλεπίδραση όταν το Cosentyx συγχορηγήθηκε με μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) καιή κορτικοστεροειδή στις μελέτες των αρθρίτιδων (περιλαμβάνουν ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα). **4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία** Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να χρησιμοποιούν μια αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 20 εβδομάδες μετά τη θεραπεία. Κύηση Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση του secukinumab σε εγκύους γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεση ή έμμεση τοξικότητα στην εγκυμοσύνη, την ανάπτυξη του εμβρύου, τον τοκετό ή την μεταγεννητική ανάπτυξη (βλ. παράγραφο 5.3). Σαν προληπτικό μέτρο, είναι προτιμητέο να αποφεύγεται η χρήση του Cosentyx κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν το secukinumab απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Οι ανασκοπαρίσεις απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα και δεν είναι γνωστό εάν το secukinumab απορροφάται συστηματικά μετά από κατάποση. Λόγω των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών από το secukinumab στα θηλάζοντα βρέφη, πρέπει να αποφασισθεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έως 20 εβδομάδες μετά τη θεραπεία ή αν θα διακοπεί η θεραπεία με Cosentyx, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας με Cosentyx για την γυναίκα. Γονιμότητα Η επίδραση του secukinumab στην ανθρώπινη γονιμότητα δεν έχει αξιολογηθεί. Οι μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις στη γονιμότητα (βλ. παράγραφο 5.3). **4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων** Το Cosentyx δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες** Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Συνολικά 6.804 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με Cosentyx σε τυφλοπαιγμένες και ανοιχτού σχεδιασμού μελέτες σε διάφορες ενδείξεις (ψωρίαση κατά πλάκας, ψωριασική αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα). Από αυτούς, 3.671 ασθενείς εκτέθηκαν στο Cosentyx επί τουλάχιστον ένα έτος, αντιπροσωπεύοντας έκθεση 6.450 ετών ασθενών. Ανεπιθύμητες ενέργειες στην ψωρίαση κατά πλάκας Τέσσερις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης ΙΙΙ στην ψωρίαση κατά πλάκας αμαδοποιήθηκαν πρακειμένου να αξιολογηθεί η ασφάλεια του Cosentyx σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο επί έως και 12 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Συνολικά, αξιολογήθηκαν 2.076 ασθενείς (692 ασθενείς σε 150 mg, 690 ασθενείς σε 300 mg και 694 ασθενείς σε εικονικό φάρμακο). Οι συχνότερα αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού (ρινοφάρυγγα ρινοφαρυγγίτιδα, ρινίτιδα). Τα περισσότερα συμβάντα ήταν ήπια ή μέτριας σοβαρότητας. Ανεπιθύμητες ενέργειες στην ψωριασική αρθρίτιδα Το Cosentyx μελετήθηκε σε δύο ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα με 590 ασθενείς (394 ασθενείς σε Cosentyx και 196 ασθενείς σε εικονικό φάρμακο) για συνολικά 755 έτη-ασθενών έκθεσης στη μελέτη (διάμεση διάρκεια έκθεσης για τους ασθενείς υπό θεραπεία με secukinumab: 469 ημέρες στη Μελέτη ΑΣ 1και 460 ημέρες στη Μελέτη ΑΣ 2). Το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε στους ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα υπό θεραπεία με Cosentyx είναι συνεπές με το προφίλ ασφάλειας στην ψωρίαση. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τις κλινικές μελέτες στην ψωρίαση, την ψωριασική αρθρίτιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα καθώς επίσης και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά (Πίνακας 1) αναφέρονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος σύμφωνα με το MedDRA. Σε κάθε κατηγορία οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες ενέργειες κατατάσσονται ανά συχνότητα, με πρώτες τις πιο συχνές αντιδράσεις. Σε κάθε κατηγορία συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται με σειρά φθίνουσας βαρύτητας. Επιπλέον, η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια βασίζεται στην ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000) και μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Πίνακας 1 Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε κλινικές μελέτες[1] και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία

Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα	Συχνότητα	Ανεπιθύμητη ενέργεια
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις	Πολύ συχνές	Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
	Συχνές	Ερητηκή λοίμωξη του στόματος
	Όχι συχνές	Καντινίτιαση του στόματος
		Τριχοφυτία των ποδιών
		Εξωτερική ωτίτιδα
	Μη γνωστές	Καντινίτιαση βλεννογόνου και δέρματος (συμπεριλαμβανομένης της καντινίτιασης του οισοφάγου)
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος	Όχι συχνές	Ουδετεροπενία
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος	Σπάνιες	Αναφυλακτικές αντιδράσεις
Οφθαλμικές διαταραχές	Όχι συχνές	Επιπεφυκίτιδα
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου	Συχνές	Ρινόρροια
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος	Συχνές	Διάρροια
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Όχι συχνές	Κνίδωση

[1] Ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες (φάσης ΙΙΙ) σε ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας, ψωριασική αρθρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα οι οποίοι εκτέθηκαν σε 300 mg, 150 mg, 75 mg ή εικονικό φάρμακο για θεραπεία διάρκειας έως 12 εβδομάδων (ψωρίαση) ή 16 εβδομάδες (ΨΑ και ΑΣ)

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Λοιμώξεις Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των κλινικών μελετών στην ψωρίαση κατά πλάκας (συνολικά 1.382 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με Cosentyx και 694 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με εικονικό φάρμακο επί έως και 12 εβδομάδες), αναφέρθηκαν λοιμώξεις στο 28,7% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx συγκριτικά με το 18,9% των ασθενών υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Η πλειοψηφία των λοιμώξεων ήταν μη σοβαρές και ήπιας έως μέτριας βαρύτητας λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού, όπως ρινοφαρυγγίτιδα, οι οποίες δεν έχρηζαν διακοπής της θεραπείας. Σημειώθηκε αύξηση των καντινιτάσεων των βλεννογόνων ή του δέρματος, συμβατή με τον μηχανισμό δράσης, αλλά τα περιστατικά ήταν ήπιας ή μέτριας βαρύτητας, μη σοβαρά, ανταποκρίνόμενα στην καθιερωμένη θεραπεία και δεν έχρηζαν διακοπής της θεραπείας. Σοβαρές λοιμώξεις παρατηρήθηκαν στο 0,14% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx και στο 0,3% των ασθενών υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο (βλ. παράγραφο 4.4). Καθ' όλη την περίοδο θεραπείας (συνολικά 3.430 ασθενείς υπό θεραπεία με Cosentyx επί έως και 52 εβδομάδες για την πλειοψηφία των ασθενών), αναφέρθηκαν λοιμώξεις στο 47,5% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx (0,9 ανά έτος παρακολούθησης ασθενούς). Σοβαρές λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 1,2% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx (0,015 ανά έτος παρακολούθησης ασθενούς). Τα ποσοστά λοιμώξεων που παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας ήταν παρόμοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν στις μελέτες της ψωρίασης. *Ουδετεροπενία* Στις κλινικές μελέτες φάσης 3 της ψωρίασης, παρατηρήθηκε ουδετεροπενία που συχνά με το secukinumab απ' ότι με το εικονικό φάρμακο, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν ήπιες, παροδικές και αναστρέψιμες. Ουδετεροπενία <1,0-0,5x10^9/l (CTCAE Βαθμού 3) αναφέρθηκε σε 18 από τους 3.430 (0,5%) ασθενείς υπό secukinumab, χωρίς δοσολογική και χρονική συσχέτιση με λοιμώξεις στις 15 από τις 18 περιπτώσεις. Δεν υπήρξαν αναφορές περιπτώσεων πιο σοβαρής ουδετεροπενίας. Μη-σοβαρές λοιμώξεις με συνήθη αντιπόκριση στην καθιερωμένη θεραπεία που δεν έχρηζαν διακοπής του Cosentyx αναφέρθηκαν στις υπόλοιπες 3 περιπτώσεις. Η συχνότητα της ουδετεροπενίας στην ψωριασική αρθρίτιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα είναι παρόμοια με εκείνη της ψωρίασης. Αναφέρθηκαν σπάνιες περιπτώσεις ουδετεροπενίας <0,5x10^9/l (CTCAE Βαθμού 4). *Αντιδράσεις υπερευαισθησίας* Στις κλινικές μελέτες, παρατηρήθηκαν ενίδυση και σπάνιες περιπτώσεις αναφυλακτικής αντίδρασης στο Cosentyx (βλ. επίσης παράγραφο 4.4). *Ανοσογονικότητα* Στις κλινικές μελέτες της ψωρίασης, της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, λιγότερο από 1% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx ανέπτυξε αντισώματα έναντι του secukinumab κατά τη θεραπεία διάρκειας έως και 52 εβδομάδων. Περίπου τα μισά από τα σχετιζόμενα με τη θεραπεία αντισώματα κατά του φαρμάκου ήταν εξουδετερωτικά, αλλά αυτό δεν σχετίστηκε με απώλεια της αποτελεσματικότητας ή με φαρμακοκινητικές ανωμαλίες. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χαλαγιός, Αθήνα Τηλ.: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr **4.9 Υπερδοσολογία** Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας στις κλινικές μελέτες. Δόσεις έως και 30 mg/kg (περίπου 2.000 έως 3.000 mg) έχουν χορηγηθεί ενδοφλεβίως στις κλινικές μελέτες χωρίς δοσοπεριοριστική τοξικότητα. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενούς για σημεία ή συμπτώματα ανεπιθύμητων ενεργειών και άμεση έναρξη κατάλληλης συμπτωματικής θεραπείας. **6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων** Τρεχαλόζη διυδρική, L-ιστιδίνη, L-ιστιδίνη υδροχλωρική μονοϋδρική, L-μεθειονίνη, Πολυσορβικό 80, Ύδωρ για ενέσιμα **6.2 Ασυμβατότητες** Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. **6.3 Διάρκεια ζωής** 18 μήνες **6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος** Φυλάσσεται σε ψυγείο (2˚C - 8˚C). Μην καταψύχετε. Εάν παραστεί ανάγκη, το Cosentyx μπορεί να φυλαχθεί εκτός ψυγείου για ένα μόνο διάστημα έως 4 ημερών σε θερμοκρασία δωματίου, όχι πάνω από 30˚C. Φυλάσσετε τις πένες στην αρχική συσκευασία για να προστατεύονται από το φως. **6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη** Το Cosentyx διατίθεται σε προγεμισμένη σύριγγα μίας χρήσεως τοποθετημένη σε πένα τριγωνικού σχήματος με διαφανές παράθυρο και ετικέτα (πένα SensoReady). Η προγεμισμένη σύριγγα στο εσωτερικό της πένας είναι μια γυάλινη σύριγγα του 1 ml με ελαστική κεφαλή εμβόλου επικαλυμμένη με FluroTec, βελόνα 27G x ½" και σκληρό κάλυμμα βελόνας από ελαστικό στυρολίου βουταδιενίου. Το Cosentyx διατίθεται σε μονές συσκευασίες που περιέχουν 1 ή 2 προγεμισμένες πένες και σε πολυσυσκευασίες που περιέχουν 6 (3 συσκευασίες των 2) προγεμισμένες πένες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. **6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλες χειρισμός** Το Cosentyx 150 mg ενέσιμο διάλυμα διατίθεται σε προγεμισμένη πένα μίας χρήσης για ατομική χρήση. Μην ανακινείτε ή καταβρέχετε την πένα. Η πένα πρέπει να βγαίνει από το ψυγείο 20 λεπτά πριν από την έγκση προκειμένου να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Πριν από τη χρήση συνιστάται ο οπτικός έλεγχος της προγεμισμένης πένας. Το υγρό πρέπει να είναι διαυγές. Το χρώμα του μπορεί να κυμαίνεται από άχρωμο σε ελαφρώς κίτρινο. Μπορεί να δείτε μία μικρή φυσαλίδα αέρα, κάτι που είναι φυσιολογικό. Να μην χρησιμοποιείται εάν το υγρό περιέχει ειδιδέκοτα σωματίδια, είναι θολό ή εικρικός χαρέ. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση παρέχονται στα φύλλο οδηγών χρήσης Κάθε χρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, United Kingdom **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** EU/1/14/980/004, EU/1/14/980/005, EU/1/14/980/007 **9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ** 15.01.2015 **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ** 15.08.2017 Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ** Cosentyx INJ. SOL PF.P 150mg/1ml BTX2, PF.PENX1ml N.T.S29,03€, A.T. 1.150,03, Cosentyx INJ.SOL PF.P 150mg/1ml STX1, PF.PENX1ml N.T 464,51€, A.T. 591,45€ **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση καιή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομειά και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομειού υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. (Ημερομηνία δελτίου τιμών: 13/07/2017 - σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει)

NOVARTIS

Είμαι (Αθήνα)
Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας,
12ο χλμ. Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 28 17 712
Φαξ: 210 28 12 014

Γραφεία Θεσσαλονίκης:
Novartis (Hellas) A.E.B.E.
12ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών
ΚΤΙΡΙΟ ΙΡΙΔΑ – Συγκ.χωρικ. 7457/001 ΒΙΟΠΑΘ
Τηλ: 2310 42 10 23/24, 2310 42 40 39
Φαξ: 2310 42 40 59

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ: 210 28997047, 210 28997147, 210 28972229, 210 28280812
(εκτός ωρών γραφείου)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες και
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης ευχαριστεί θερμά για την ενεργό συμμετοχή τους στην 5η Επιστημονική Εκδήλωση της ΕΛ.Ε.ΔΕ. τις κάτωθι εταιρείες:

ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

NOVARTIS

ΧΟΡΗΓΟΙ

abbvie

Aidom pharma

boderm™

DERMLITE

dm solutions derma • medical • cosmetic

since 1979 ecomed LASER

Epsilon Health

FREZYDERM

FROÏKA Dermocosmetics MEDICAL DEVICES - CE

GALDERMA

janssen Immunology

KEY MEDICAL SOLUTIONS

LEO

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

MEDIMAR S.A.

Ouzounis MEDICAL EQUIPMENT

PAPAPOSTOLOU HEALTHCARE TECHNOLOGIES est. 1914

Pfizer

EAU THERMALE Avène

Roche

Οι χορηγοί αναφέρονται με αλφαβητική σειρά

Enbrel®

etanercept

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ του προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

PFIZER HELLAS A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 67 85 800,
Τηλ. Παραγγελιών: 210 81 99 060

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-ENB-GRC-0041-MAR17

Cosentyx®
secukinumab

Μακροχρόνια Εμπιστοσύνη

Αυτό είναι το δέρμα της
Τόσο καθαρό...

Αυτή είναι η ζωή της
Τόσο διαφορετική...

Αυτό είναι το Cosentyx

"ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΑ-ΣΟΒΑΡΗ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ[1]

1. Cosentyx® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

COS_THATS_ADV_065_Sept_2017 GR1711727689

NOVARTIS

Έδρα (Αθήνα)
Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας,
12ο χλμ. Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 28 11 712
Φαξ: 210 28 12 014

Γραφεία Θεσσαλονίκης
Novartis (Hellas) A.E.B.E.
12ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών
ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΑΝΑ - 2ος όροφος,ΤΚ57001 ΘΕΡΜΗ
Τηλ.: 2310 42 10 23/24, 2310 42 40 39
Φαξ: 2310 42 40 59

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ: 210 2897047, 210 2897147, 210 2897220, 210 2828812 (εκτός ωρών γραφείου)